



Inyectables

Orales

Premezclas medicamentosas

Alimentos funcionales

Desinfectantes

COCCIKLASS 50 mg/ml

Suspensión oral

Toltrazurilo



Orales

Mevet

Polígono Industrial El Segre

Parc. 409-410

25191 Lleida, España

T. +34 973 210 269

www.mevet.es

Comercializado por

Albio Ferm

Polígono Industrial Can Salvatella

C. Mogoda, 16-18

08210 Barberà del Vallès, España

T. +34 93 729 17 64

Orales

COCCIKLASS 50 mg/ml

Suspensión oral

Toltrazurilo



COMPOSICIÓN POR ml

Sustancia activa:

Toltrazurilo 50 mg

Excipientes:

Benzoato de sodio (E 211) 2,1 mg

Propionato de sodio (E 281) 2,1 mg

ESPECIES DE DESTINO

Porcino (lechones de 3 a 5 días).

INDICACIONES DE USO

Para la prevención de los signos clínicos de la coccidiosis en lechones neonatales (de 3 a 5 días) en granjas con una historia confirmada de coccidiosis causada por *Isospora suis*.

TIEMPO DE ESPERA

Carne: 73 días.

POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Administración por vía oral.

Tratamiento animal individualizado.

Cada cerdo debe ser tratado en el día 3-5 de vida con una dosis oral única de 20 mg de toltrazurilo por kg de peso vivo (equivalente a 0,4 ml de medicamento por kg de peso vivo).

PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de conservación.

FORMATOS

Caja con 1 frasco de 250 ml

Caja con 15 frascos de 250 ml

Frasco de 1 litro

Nº REGISTRO

2908 ESP

