



Mevet

Inyectables

Orales

Premezclas medicamentosas

Alimentos funcionales

Desinfectantes

COLIVALL 2.000.000 UI/ml

Solución para administración en agua de bebida o leche

Sulfato de colistina



Orales

Mevet

Polígono Industrial El Segre

Parc. 409-410

25191 Lleida, España

T. +34 973 210 269

www.mevet.es

Comercializado por

Albio Ferm

Polígono Industrial Can Salvatella

C. Mogoda, 16-18

08210 Barberà del Vallès, España

T. +34 93 729 17 64

Orales

COLIVALL 2.000.000 UI/ml Solución para administración en agua de bebida o leche

Sulfato de colistina



COMPOSICIÓN POR ml

Sustancia activa:

Colistina (sulfato) 2.000.000 UI

Excipientes:

Alcohol bencílico (E 1519) 10 mg

ESPECIES DE DESTINO

Terneros, corderos, porcino y aves.

INDICACIONES DE USO

Tratamiento y metafilaxis de las infecciones gastrointestinales causadas por estirpes de *Escherichia coli* no invasiva susceptible a la colistina.

Debe confirmarse la presencia de la enfermedad en el rebaño antes del tratamiento metafiláctico.

TIEMPO DE ESPERA

Carne: terneros, corderos, porcino y aves: 1 día.

Huevos: cero días.

POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Administración en agua de bebida o en leche.

Terneros, corderos y porcino: administrar 100.000 UI de colistina/kg p.v./día (equivalente a 0,5 ml de medicamento/10 kg p.v./día) durante 3-5 días consecutivos, en el agua de bebida o en lactorreemplazante.

La dosis diaria recomendada debe dividirse por dos, en caso de administrar el producto directamente en la boca del animal.

Aves: administrar 75.000 UI de colistina/kg p.v./día (equivalente a 0,0375 ml de medicamento/kg p.v./día) durante 3-5 días consecutivos, en el agua de bebida.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de conservación.

FORMATOS

Frasco de 1 litro

Bidón de 5 litros

Nº REGISTRO

2981 ESP

