



Inyectables

**Orales**

Premezclas medicamentosas

Alimentos funcionales

Desinfectantes

## DOXICIVALL POLVO

Polvo para solución oral

Doxiciclina hclato



**Orales**

### **Mevet**

Polígono Industrial El Segre  
Parc. 409-410  
25191 Lleida, España  
T. +34 973 210 269  
[www.mevet.es](http://www.mevet.es)

Comercializado por

### **Albio Ferm**

Polígono Industrial Can Salvatella  
C. Mogoda, 16-18  
08210 Barberà del Vallès, España  
T. +34 93 729 17 64

## Orales

# DOXICIVALL POLVO

## Polvo para solución oral

### Doxiciclina hiclato



#### COMPOSICIÓN POR g

##### Sustancia activa:

Doxiciclina (hiclato) 500 mg

#### ESPECIES DE DESTINO

Cerdos de cebo y pollos

#### INDICACIONES DE USO

**Cerdos de cebo:** prevención y tratamiento del Complejo Respiratorio Porcino causado por cepas sensibles de *Bordetella bronchiseptica* y *Pasteurella multocida*.

**Pollos:** colibacilosis, CRD y micoplasmosis.

#### TIEMPO DE ESPERA

**Cerdos de cebo:** carne: 6 días.

**Pollos:** carne: 4 días.

**Huevos:** no está permitido su uso en aves cuyos huevos se destinen a consumo humano.

#### POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Administración por vía oral, en el agua de bebida.

**Cerdos de cebo:** 10 mg de doxiciclina (hiclato)/kg p.v./día durante 5 días, equivalente a 20 mg de medicamento/kg p.v./día durante 5 días.

**Pollos:** 20 mg de doxiciclina (hiclato)/kg p.v./día durante 3-5 días consecutivos, equivalente a 40 mg de medicamento/kg p.v./día durante 3-5 días.

#### PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar a no más de 25 °C, en lugar seco y al abrigo de la luz.

#### FORMATOS

Bolsa con 200 g

#### Nº REGISTRO

1260 ESP

