



Inyectables

Orales

Premezclas medicamentosas

Alimentos funcionales

Desinfectantes

TILOVALL 1000 mg/g

Polvo para administración en agua de bebida o en leche

Tartrato de tilosina



Orales

Mevet

Polígono Industrial El Segre

Parc. 409-410

25191 Lleida, España

T. +34 973 210 269

www.mevet.es

Comercializado por

Albio Ferm

Polígono Industrial Can Salvatella

C. Mogoda, 16-18

08210 Barberà del Vallès, España

T. +34 93 729 17 64

Orales

TILOVALL 1000 mg/g Polvo para administración en agua de bebida o en leche

Tartrato de tilosina



COMPOSICIÓN POR g

Sustancia activa:

Tilosina tartrato 1000 mg

ESPECIES DE DESTINO

Bovino (terneros lactantes), porcino y aves (pollos de engorde).

INDICACIONES DE USO

Terneros lactantes: neumonías asociadas a micoplasmas y pasteurelas.

Porcino: diarreas producidas por microorganismos sensibles.

Pollos de engorde: enfermedad respiratoria crónica (CRD) y aerosaculitis.

TIEMPO DE ESPERA

Terneros lactantes: carne: 5 días

Porcino: carne: 1 día

Pollos de engorde: carne: 5 días

Huevos: su uso no está autorizado en aves cuyos huevos se utilizan para el consumo humano.

POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Administración en agua de bebida o en leche.

Terneros: 1 g de tilosina tartrato/ternero lactante (equivalente a 1 g de medicamento/ternero lactante) disuelto en el agua o en leche. Administrar 2 veces al día durante 5-7 días.

Porcino: 0,25 g de tilosina tartrato/litro de agua de bebida (equivalente a 250 g de medicamento/1.000 litros de agua) durante 3-10 días.

Pollos de engorde: 0,5 g de tilosina tartrato/litro de agua de bebida (equivalente a 500 g de medicamento/1.000 litros de agua) durante 2-5 días.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Mantener la bolsa perfectamente cerrada con objeto de proteger su contenido de la luz.

FORMATOS

Bolsa con 250 g

Bolsa con 500 g

Nº REGISTRO

947 ESP

